

REPORT PERIODICO DI QUALITÀ DELL'ARIA


Comune di **Carsoli**

Periodo di riferimento:

dal 25/10/2023 al 24/04/2024

| | |
|---|----|
| Posizione dei sensori..... | 3 |
| Variazione temporale e comparazione con gli standard Europei..... | 4 |
| Valutazione complessiva della qualità dell'aria..... | 4 |
| Variazione temporale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10..... | 5 |
| Comparazione con gli Standard Europei..... | 6 |
| Ciclicità delle concentrazioni..... | 7 |
| Giornata tipo..... | 7 |
| Settimana tipo..... | 8 |
| Comparazione intracomunale..... | 9 |
| Variazione spaziale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 nel periodo osservato. | 9 |
| Comparazione intercomunale..... | 11 |
| Contesto italiano..... | 11 |
| Contesto interregionale..... | 13 |
| Contesto demografico..... | 14 |
| Contesto morfologico..... | 15 |
| Comparazione tra annualità..... | 16 |
| Analisi di contesto e situazione emissiva nel territorio comunale..... | 19 |
| Analisi dei dati provenienti dagli inventari delle emissioni..... | 19 |
| Condizioni meteorologiche..... | 22 |
| Possibili iniziative territoriali a favore della qualità dell'aria implementabili nel Comune..... | 23 |
| Segnalazioni di molestie olfattive..... | 24 |
| Appendice A - Dettagli risposte molestie olfattive..... | 25 |

Posizione dei sensori



I sensori della rete di Carsoli attivi alla data di chiusura del report sono 4, installati nelle seguenti posizioni (in blu sulla mappa):

A Via Castello, indicato nel sistema come 'Via Castello'


B Via Recocce, indicato nel sistema come 'Via Recocce'

C Piazza della Liberta, indicato nel sistema come 'Piazza della Liberta'

D Largo delle Scuole 1, Poggio Cinolfo, indicato nel sistema come 'Largo delle Scuole 1, Poggio Cinolfo'

Variazione temporale e comparazione con gli standard Europei

Valutazione complessiva della qualità dell'aria




- **VERDE** (Wiseindex tra 0 e 40)
Vi è un'alta probabilità che le concentrazioni di particolato PM2.5 siano sotto la soglia proposta dall'European Environmental Agency (EEA) come soglia di attenzione per l'impatto sulla salute. L'aria è pulita e non ha impatto sulla salute dei cittadini.
- **GIALLO** (Wiseindex tra 40 e 60)
Vi è un'alta probabilità che le concentrazioni di particolato PM2.5 siano a cavallo della soglia proposta dall'European Environmental Agency (EEA) come soglia di attenzione per l'impatto sulla salute.
- **ROSSO** (Wiseindex tra 60 e 100)
Vi è un'alta probabilità che le concentrazioni di particolato PM2.5 superino la soglia dall'European Environmental Agency (EEA) come soglia di attenzione per l'impatto sulla salute.

I valori del Wiseindex sono calcolati a partire dagli intervalli di misurazione del PM2.5 definiti dall'European Air Quality Index.

Le principali informazioni che abbiamo estratto sono:

- La percentuale di giorni **VERDI** rispetto ai giorni per cui sono disponibili dati è stata pari a **100%**.
- Il **mese con l'aria più pulita** (tra i mesi per cui sono disponibili almeno 20 giorni di dati) è stato **dicembre 2023**, con **31 giorni VERDI**.
- Il **mese con l'aria più sporca** (tra i mesi per cui sono disponibili almeno 20 giorni di dati) è stato **novembre 2023**, con **30 giorni VERDI**.

Variazione temporale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10



I grafici riportano la variazione temporale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 nel periodo in analisi. Concentrandoci sul PM2.5, che rappresenta l'inquinante con il maggior impatto sulla salute dei cittadini, le informazioni rilevanti sono:

- Il **periodo di aria pulita** (giorni consecutivi con Wiseindex inferiore a 40) **più lungo** è durato **182 giorni** a partire dal **25 ottobre 2023**.

Nell'analizzare il trend annuale dell'inquinamento atmosferico occorre distinguere tra due periodi, ovvero quello primaverile/estivo e quello autunnale/invernale. Durante quest'ultimo, infatti, si assiste spesso ad un aumento generale delle concentrazioni di particolato per via di diversi fattori

Il primo fattore è spiegabile a livello fisico considerando il **fenomeno dell'inversione termica**. Durante le stagioni più fredde, infatti, l'abbassamento della temperatura e dell'irradiazione solare vanno a ridurre il rimescolamento delle polveri. Il particolato tende quindi ad accumularsi negli strati più bassi e a contatto con il

suolo. L'aumento dei livelli di particolato durante il periodo autunnale/invernale è favorito anche dall'**accensione dei riscaldamenti**.

Il periodo autunnale/invernale risulta quindi particolarmente delicato da monitorare, considerando l'impatto che l'innalzamento dei livelli di particolato può avere sulla salute dei cittadini. Proprio per questo motivo, si tratta anche di un orizzonte temporale in cui è possibile implementare iniziative ad impatto per il miglioramento della qualità dell'aria.

Comparazione con gli Standard Europei

Gli standard di riferimento scelti sono quelli dall'European Environmental Agency (EEA). L'Agenzia Europea, attraverso l'elaborazione del proprio Air Quality Index, non fissa dei limiti normativi per il PM10 o per il PM2.5, propone invece degli intervalli di misurazione oltre i quali la qualità dell'aria può iniziare ad avere un impatto sulla salute delle persone la qualità dell'aria passa da 'moderata' a 'scarsa'. Nello specifico i due limiti sono:

- **Oltre i 50 µg/m3** di media giornaliera per il PM10
- **Oltre i 25 µg/m3** di media giornaliera per il PM2.5

0 giorni

Superamenti della soglia di PM2.5 (su 182 giorni)



0 giorni

Superamenti della soglia di PM10 (su 182 giorni)

Ciclicità delle concentrazioni



Giornata tipo

L'andamento giornaliero della concentrazione di PM2.5 e PM10, considerando le due metà del periodo selezionato:





Settimana tipo

L'andamento settimanale della concentrazione di PM2.5 e PM10, considerando le due metà del periodo selezionato:



Comparazione intracomunale

Variazione spaziale delle concentrazioni di PM2.5 e PM10 nel periodo osservato



Il primo dei due grafici sopra riportati mostra una comparazione tra le concentrazioni di PM2.5 nelle zone in cui è stato effettuato il monitoraggio. Il secondo dei due grafici mostra una comparazione tra le concentrazioni di PM10 nelle stesse zone. È bene ricordare che questo confronto ha una valenza unicamente qualitativa: esso può essere il punto di partenza per valutazioni e analisi più approfondite.

Nello specifico delle aree monitorate, possiamo fare una valutazione di come ciascuna zona si posiziona rispetto alla media del territorio, per evidenziare eventuali differenze territoriali significative:

| Località | Giorni migliori della media | Giorni comparabili alla media | Giorni peggiori della media |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Via Castello | 41% | 37% | 22% |
| Via Recocce | 17% | 69% | 14% |
| Piazza della Liberta | 6% | 43% | 52% |
| Largo delle Scuole 1, Poggio Cinolfo | 42% | 56% | 2% |


Comparazione intercomunale

Contesto italiano


Comuni italiani

Nel periodo di riferimento, il Comune di Carsoli ha totalizzato **182 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **primo posto tra tutti i Comuni italiani** monitorati da Wiseair, con il **88% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni italiani.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto interregionale


Comuni del Centro Italia

Nel periodo di riferimento, il Comune di Carsoli ha totalizzato **182 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **primo posto tra tutti i Comuni del Centro Italia** monitorati da Wiseair, con il **57% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni del Centro Italia.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto demografico


Comuni con popolazione simile

Nel periodo di riferimento, il Comune di Carsoli ha totalizzato **182 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **primo posto tra tutti i Comuni con popolazione simile** monitorati da Wiseair, con il **88% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni con popolazione simile.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Contesto morfologico


Comuni con caratteristiche morfologiche simili

Nel periodo di riferimento, il Comune di Carsoli ha totalizzato **182 giorni di buona qualità dell'aria**. Questo dato lo posiziona al **primo posto tra tutti i Comuni con caratteristiche morfologiche simili** monitorati da Wiseair, con il **22% dei giorni migliori della media del cluster**.

Il seguente grafico riporta, mese per mese, il numero di giorni **migliori, comparabili** e **peggiori** rispetto alla media dei Comuni con caratteristiche morfologiche simili.



Di seguito è invece riportato un **confronto tra i periodi più lunghi con aria buona** (in verde) e **scarsa** (in rosso):




Comparazione tra annualità

Confrontando i dati di qualità dell'aria rilevati nel corso degli anni, si può osservare che:

- Il **periodo di aria pulita** (giorni consecutivi con Wiseindex inferiore a 40) **più lungo** è durato **67 giorni** a partire dal **25 ottobre 2022**. 115 giorni in più rispetto quello dell'anno precedente.

Classificando i giorni in base al valore giornaliero di wiseindex registrato dai dispositivi:



Sono stati registrati i seguenti sforamenti:


| Anno | Giorni sforamenti pm2.5 | Giorni sforamenti pm10 |
|------|-------------------------|------------------------|
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |

Le concentrazioni medie di particolato nel corso delle annualità sono le seguenti:

| Anno | Media pm2.5 | Media pm10 |
|------|-------------|------------|
| 2023 | 7.5 | 11.6 |


| | | |
|------|-----|------|
| 2022 | 8.6 | 12.7 |
|------|-----|------|

La concentrazione di PM2.5 mensile ha avuto il seguente andamento



| | 2023 | 2022 |
|----------|------------|------|
| gennaio | 7.9 (+3%) | 7.6 |
| febbraio | 7.8 (-33%) | 11.7 |
| marzo | 7.4 (+12%) | 6.6 |
| aprile | 8.4 (+52%) | 5.5 |
| ottobre | 5.6 (-57%) | 13.0 |
| novembre | 6.0 (-14%) | 7.1 |
| dicembre | 8.4 (-27%) | 11.4 |

La concentrazione di PM10 mensile ha avuto il seguente andamento



| | 2023 | 2022 |
|----------|-------------|------|
| gennaio | 11.4 (+10%) | 10.4 |
| febbraio | 11.6 (-29%) | 16.4 |
| marzo | 11.9 (+14%) | 10.5 |
| aprile | 14.6 (+65%) | 8.9 |
| ottobre | 9.5 (-59%) | 23.5 |
| novembre | 9.4 (-10%) | 10.5 |
| dicembre | 11.8 (-25%) | 15.7 |

Analisi di contesto e situazione emissiva nel territorio comunale

La qualità dell'aria registrata in una determinata area geografica, come quella comunale, dipende essenzialmente da **3 macrofattori**:

- **Le fonti emissive esterne** all'area geografica di riferimento, che contribuiscono al cosiddetto *inquinamento di background* (o *inquinamento di fondo*);
- **Le fonti emissive interne** all'area geografica di riferimento, che contribuiscono al cosiddetto *inquinamento locale*;
- **Le condizioni meteorologiche** che, a pari situazione emissiva, possono incrementare o mitigare (anche sensibilmente) le concentrazioni di inquinanti al suolo.

Per avere un quadro quanto più completo e rappresentativo è **quindi importante complementare l'analisi di campo condotta nelle precedenti sezioni con un'analisi di contesto** effettuata a partire dai dati ufficiali di emissione e di concentrazione raccolti negli anni e resi disponibili dalle agenzie pubbliche preposte.

Analisi dei dati provenienti dagli inventari delle emissioni

Di seguito sono riportati i più recenti dati EMEP GRID relativi alle emissioni totali annuali di PM2.5 e di PM10 in un'area di circa 100 km² comprendente il territorio comunale:


| Emissioni totali (2020) | PM2.5 | PM10 |
|-------------------------|-------|-------|
| tot/anno | 33.27 | 39.55 |

Le fonti e le attività che contribuiscono a tali valori possono essere di vario genere (es. mobilità, riscaldamento, industria, agricoltura ...) e possono variare di Comune in Comune a seconda delle specificità sociali, strutturali ed economiche che caratterizzano il territorio. Di seguito si riportano i contributi percentuali alle emissioni totali per ciascuna delle principali categorie emissive individuate a partire dal database EMEP:


| Categoria | PM2.5 | PM10 |
|--|-------|-------|
| Riscaldamento e combustione residenziale | 71.4% | 60.8% |
| Trattamento rifiuti | 3.7% | 3.3% |
| Trasporto su strada | 22.8% | 26.0% |
| Utilizzo di solventi | 0.8% | 0.7% |
| Settore zootecnico | 0.6% | 1.1% |
| Agricoltura | 0.5% | 7.8% |
| Trasporto (altro) | 0.3% | 0.2% |

La metodologia ideale per la realizzazione di un inventario emissivo è quella che prevede la quantificazione diretta, ad esempio tramite rilevazioni sul campo, di tutte le emissioni delle diverse tipologie di sorgenti per l'area e il periodo di interesse. Questo ovviamente non è fattibile a livello locale. I dati EMEP GRID forniscono una quantificazione dei contributi delle diverse sorgenti emissive attraverso una stima indicativa sulla base di un indicatore che caratterizza l'attività della sorgente e di un fattore di emissione. Costituiscono dunque un punto di partenza per approfondire analisi e iniziative locali sulle sorgenti emissive di maggior interesse e impatto.

A completamento dello scenario emissivo comunale per il PM2.5, si riportano di seguito alcune elaborazioni GIS dei dati di emissioni di PM2.5 derivanti dall'inventario europeo EMEP GRID. Tali analisi grafiche permettono di inquadrare le caratteristiche emissive del Comune all'interno di un contesto geografico di riferimento più ampio.





(C) OpenStreetMap contributors (C) CARTO



(C) OpenStreetMap contributors (C) CARTO

Condizioni meteorologiche

Il fenomeno meteorologico che più di tutti favorisce la dispersione degli inquinanti atmosferici è il vento. In particolare, diversi studi dimostrano come la dispersione del PM10 e del PM2.5 sia particolarmente efficace per venti con velocità superiori ai 5 m/s.



Segnalazioni di molestie olfattive

Di seguito l'elenco delle segnalazioni delle molestie olfattive sul territorio di Carsoli, da parte dei cittadini, raccolte grazie all'applicazione Ido - Wiseair per smartphone.

In questo periodo ci sono state 3 segnalazioni.


[Le risposte complete sono consultabili all'appendice A di questo documento](#)

Sono stati segnalati i seguenti tipi di odori:

- Plastica bruciata: 1 volta
- Carburante: 1 volta

E i cittadini hanno segnalato i seguenti tipi di odori non predefiniti: Tipo bachelite/Odore chimico

Le molestie olfattive sono stati segnalate con le seguenti intensità:



Appendice A - Dettagli risposte molestie olfattive

| Località | Data | Dettagli |
|--|------------------------|---|
| Carsoli Via Roma | 21 giu 2023 Mattino | Tipi: - Intensità: 4 Durata: Alcune ore Provenienza: Zona industriale Note: - |
| Carsoli Via Giuseppe Mazzini | 14 giu 2023 Mattino | Tipi: Plastica bruciata, Carburante, Tipo bachelite Intensità: 4 Durata: Alcune ore Provenienza: Non saprei, l'aria ne è pervasa Note: Le vostre centraline dicono che è tutto ok |
| Carsoli Zona Industriale | 29 mag 2023 Mattino | Tipi: Odore chimico Intensità: 3 Durata: Alcune ore Provenienza: Qualche fabbrica Note: - |